

FAQ

Foire Aux Questions



**Webinaire promotion
de la vaccination en Ehpad**

Jeudi 12 septembre 2024

Thématique Grippe/Covid (1/2)

Question : Pour cette année, le Covid semble en recrudescence, conseillez-vous une nouvelle dose de vaccin ?

Réponse : Oui, la vaccination contre le Covid est fortement recommandée cette année encore, début de la campagne vaccinale Grippe/Covid le 15 octobre 2024.

.....

Questions : À quand les vaccins combinés Grippe/Covid ?
Pour la campagne 2025/2026 ?

Quels vaccins anti-Covid seront à disposition au début de la campagne vaccinale ?

Réponse : Cette année, pas de vaccin combiné pour la campagne de vaccination mais possiblement l'année prochaine (tests actuellement encore en cours pour tester l'efficacité sur les souches). Le seul vaccin contre le Covid adapté au variant circulant JN.1 à avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché est le Comirnaty JN.1.

.....

Question : Avez-vous des données sur la transmission de soignant à soigné pour la Grippe/Covid ?

Réponse : Le HCSP avait été saisi pour statuer sur l'obligation vaccinale anti-grippale pour les soignants, et celle-ci n'a pas été retenue. La pédagogie est à privilégier, de même que la présence des IDE des EMH sur le terrain pour informer, former et motiver les résidents et les professionnels. La transmission d'un professionnel vers un patient est possible, même en l'absence de symptôme mais avec un prélèvement positif (étude lyonnaise). La vaccination permet de réduire la contagiosité lors d'épisode asymptomatique. Importance du respect des mesures barrières. Importance d'une politique vaccinale.

Thématique Grippe/Covid (2/2)

Question : Est-il possible de mutualiser également la vaccination Grippe / Covid / Pneumocoque avec la vaccination contre la Coqueluche ?

Réponse : Oui ! Pas de souci pour faire 4 vaccinations la même journée, ou bien espacées et dans ce cas pas de délai particulier à respecter.

.....

Question : Vous avez évoqué les études qui mettent en évidence les effets à 3 mois du Covid chez les personnes âgées : A l'époque sur quelle souche ont été faites ces études ? Delta ? Omicron ?

Réponse : L'étude avait été faite avec la souche Delta.

.....

Question : Nous avons vacciné en juin contre le Covid, pouvons-nous refaire une injection en même temps que la Grippe, cela ne fera pas trop tôt entre les deux injections ?

Réponse : Oui, il est possible de vacciner dès l'ouverture de la campagne à partir du 15 octobre. Avec le temps la protection vaccinale diminue et notamment chez la personne âgée, il est donc possible de vacciner de nouveau.

.....

Questions : Combien de temps minimum entre 2 vaccinations contre la Covid ? Il a été dit dans la présentation que ça passait à 3 mois ?

Réponse : Le délai recommandé est de 6 mois pour la population générale mais est de 3 mois pour les personnes âgées et les patients immunodéprimés.

Thématique VRS

Question : Le prix des vaccins anti-VRS sont particulièrement élevés, savez-vous si un remboursement peut être envisagé ? Il y a la notion d'attente d'efficacité en vie réelle mais s'il n'est pas utilisé ?

Réponse : Concernant le vaccin contre le VRS, celui-ci n'est pas encore mis sur le marché donc les notions de tarifs ne sont pas encore connues. Ce qui semble se dessiner est que le remboursement sera total pour les patients de plus de 75 ans et le sera également pour les patients de plus de 65 ans présentant une pathologie associée.

Les vaccins contre le pneumocoque (PREVENAR 20 et VAXNEUVANCE) sont remboursés.

.....

Questions : Pour la vaccination anti-VRS des personnes âgées, faut-il privilégier un vaccin (sur les 2 possibles) ?

Pour cette automne pour nos personnes âgées, il faudra une vaccination Grippe + Covid + VRS et si non réalisé auparavant penser au PREVENAR 20 et au SHINGRIX ?

Réponse : Pour la campagne vaccinale 2024-2025, 4 vaccins sont à faire (Grippe, COVID, pneumocoque et Zona), le vaccin contre le VRS n'est pas disponible à ce jour.

Pour des raisons de saisonnalité avec haut risque de Covid/Grippe, privilégier en période automnale les 2 vaccins Grippe/Covid et faire pneumocoque, SHINGRIX pour les patients déjà déjà vaccinés contre la Grippe et le Covid.

Si période hors épidémie, faire les vaccins contre le pneumocoque puis contre le zona quand on veut dans un schéma à 3 rendez-vous (PREVENAR 20, SHINGRIX dose 1 , SHINGRIX dose 2).

Thématique Pneumocoque (1/2)

Question : Y'a t'il un intérêt à vacciner contre le pneumocoque les enfants polyhandicapés vivant en institution ?

Réponse : Obligation vaccinale pour ceux nés après 2018 mais au regard de l'aspect vie communautaire et risque épidémique élevé, cela semble pertinent de vacciner les enfants polyhandicapés vivant en institution contre le pneumocoque. Pas de recommandation officielle à ce sujet.

.....

Question : Les recommandations vaccinales ciblent les immunodéprimés et les porteurs d'une pathologie à risque mais il n'existe pas de critère d'âge. Faut-il vacciner de façon systématique en Ehpad ?

Réponse : Certains établissements le font, les facteurs de vulnérabilité sont présents en Ehpad comme dans d'autres établissements notamment du secteur du handicap. Ces résidents n'entrent pas dans la définition des immunodéprimés mais ont des pathologies et des facteurs de vulnérabilité importants. Par ailleurs, il faut également prendre en compte l'aspect vie communautaire et le risque d'épidémie virale élevé dans ces établissements.

.....

Question : Le REVAXIS n'existe plus et n'a pas d'équivalent. Que recommandez-vous pour vacciner en totalité nos résidents qui viennent d'être admis en Ehpad ? REVAXIS peut être remplacé par REPEVAX ou BOOSTRIX (DTCP) ?

Réponse : Oui absolument, indépendamment de la date du dernier vaccin contre la coqueluche.

Thématique Pneumocoque (2/2)

Question : Peut-on faire 2 injections de REPEVAX et rappel à 1 an chez des patients jamais vaccinés ?

Réponse : Oui absolument, 3 injections sont nécessaires, en respectant au moins 2 mois entre la 1ère et la 2ème injection, et au moins 6 mois entre la 2ème et la 3ème injection. En cas de doute sur le statut vaccinal antérieur, on peut aussi s'aider de la sérologie tétanos avec dosage des anticorps 4 à 8 semaines après une première injection. Cf page 5 du document ci-joint :

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-01/fiche_synthese_rattrapage_vaccinal_population_generale_vf.pdf

.....

Question : Concernant le PREVENAR 20 (qui simplifie le schéma vaccinal), il n'a pas été démontré sa non infériorité par rapport à la séquence VPC13 VPP23 pour le sérotype 8 alors que ce dernier est fréquent est ce que cela est problématique ?

Réponse : Résultats de l'étude à ne pas remettre en cause, essai bien conduit. Prendre du recul sur l'efficacité annoncée d'un vaccin sur un sérotype précis. Il faut regarder la simplification du schéma qui est apportée par ces nouveaux vaccins.

.....

Question : Est-il possible de vacciner Grippe/Covid/Pneumocoque dans le même temps. Pourriez-vous, s'il vous plait, nous préciser cette temporalité : Par exemple, Grippe / Covid même jour mais bras différent puis Pneumocoque à quelques jours d'intervalle ?

Réponse : Oui, il est possible de faire les 3 vaccins le même jour. La seule règle à respecter est d'espacer les sites d'injection de plus de 2 cm. Si on décide de ne pas faire l'ensemble des vaccinations le même jour, qu'elle qu'en soit la raison, il n'y a pas de délai à respecter entre les 2 sessions de vaccination.

Thématique Coqueluche (1/2)

Question : Qu'en est-il de la coqueluche, vu la recrudescence ? Systématiquement avec le DTP ou uniquement les résidents avec petits enfants ou tous les résidents ?

Réponse : Mise à jour systématique du calendrier vaccinal pour tous les résidents dont le dernier vaccin coqueluche remonte à plus de 5 ans.

.....

Question : Efficacité du vaccin coqueluche ? Nombreux cas chez les vaccinés !

Réponse : Plusieurs éléments peuvent être apportés pour cette réponse :

- La durée de protection du vaccin contre la coqueluche est d'environ 5 ans, mais peut être plus courte chez certains patients. L'efficacité est d'environ 90% dans les 2 ans qui suivent l'administration. Donc la protection n'est pas totale et diminue avec le temps.
 - La bactérie en cause de l'infection, il peut aussi s'agir d'une infection à *Bordetella parapertussis* sur laquelle le vaccin est inefficace.
-

Question : Existe-t-il des recommandations particulières à l'Ehpad (résidents / personnels) suite à l'épidémie de coqueluche ?

Réponse : Il faut vacciner les résidents car tous les 3-4 ans il y a une augmentation fréquente du nombre de cas, accentué possiblement cette année par la crise sanitaire de 2020. Document CPias utilisation de la PCR diagnostique et CAT pour les résidents et professionnels.

Thématique Coqueluche (2/2)

Question : Nous venons d'avoir 3 cas de coqueluche en Ehpad hospitalier, donc beaucoup de cas contacts chez les professionnels comme chez les résidents, donc beaucoup de personnes pour lesquelles une antibioprophylaxie a été administrée, car le rappel remontait à plus de 5 ans.

Ce qui nous motive à refaire une campagne vaccinale anti coqueluche (REPEVAX) chez les résidents d'Ehpad comme chez les professionnels (que nous envoyons chez leur médecin traitants)

Mais nous ne nous sentons pas très soutenus par les textes.

Il existe des campagnes officielles vaccinations anti Grippe, Covid, pneumocoque mais on ne parle pas beaucoup de la coqueluche.

D'un point de vue recommandations ou texte réglementaire, sur quoi peut-on se baser ?

Réponse : Il y a les publications de la DGS ainsi que l'avis du HCSP du 30 juillet 2024 (notamment le logigramme page 17) : <https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1386>

Vous trouverez également des recommandations de la HAS datant de juillet 2024 : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3531483/fr/decision-n2024-0204/dc/sespev-du-18-juillet-2024-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-portant-adoption-de-la-recommandation-vaccinale-intitulee-strategie-de-vaccination-contre-la-coqueluche-dans-le-contexte-epidémique-de-2024-rappel-vaccinal-des-professionnels-au-contact-des-personnes-a-risque-de-forme-grave

Autres thématiques (1/4)

Autorisation

Question : Faut-il l'accord d'un tuteur ou de la famille pour la vaccination d'une personne polyhandicapée / en Ehpad ? Ou l'avis d'un médecin prime ?

Réponse : Pour la réalisation de tout type de soins, l'accord du patient ou d'un tuteur est obligatoire.

.....

Question : Qu'est-ce qui empêche l'instauration d'une obligation vaccinale à l'entrée des résidents en institution, à l'instar des enfants en collectivité ? On pourrait rattraper le schéma en attendant l'entrée

Réponse : Sur le plan juridique l'Ehpad est un domicile, un lieu de vie des résidents, situation ne permettant pas d'appliquer une loi qui finalement s'appliquerait à l'ensemble de la population.

.....

Questions : Est-ce qu'il existe des recommandations spécifiques concernant la vaccination des résidents d'Ehpad ? Le calendrier ne précise que les sujets âgés à risque particulier sans spécifier l'institution.

Réponse : L'obligation vaccinale concerne tous les enfants pas seulement certains. Donc demander la vaccination à des résidents d'Ehpad reviendrait à demander à toute la population de se faire vacciner. Sur le plan juridique c'est le médecin coordonnateur qui est responsable de la formation des professionnels pour lequel la mission 13, du texte en vigueur actuellement (exercice en France régit par un texte de loi), parle de la prévention des risques donc opposable mais le médecin co peut informer, former, convaincre, motiver mais sans obligation.

Autres thématiques (2/4)

Outils

Question : Quels outils pourrions-nous déployer pour améliorer la situation ?

Réponse : Outils des CPias prévention des infections respiratoires aiguës, méthodologie et stratégie vaccinale notamment anti-grippale avec une personne ressource sur le terrain. Aller vers, former, expliquer par des professionnels de l'établissement ainsi que par les EMH.

.....

Question : Existe-t-il une Formation Ouverte et à Distance accessible aux IDE sur la vaccination en ESMS ?

Réponse : Oui, plusieurs formations sont possibles :

- Via les facultés (comme c'est le cas sur Angers)
- Via des organismes privés (comme Eduprat, santé académie, Isis et bien d'autres)
- Vous pouvez aussi interroger les acteurs régionaux : EMH, CPias, CRAtb

Selon les organismes, les formations sont présentielle, distancielles ou mixtes.

Bien vérifier que la durée de la formation est d'au moins 10h30.

On peut également retrouver la liste des organismes dispensant ces formations sur le site ANDPC (inscription via le numéro RPPS) avec un système de tri des formations selon différents critères (géographique, public, format...). Bien penser à cocher le public « autres salariés » pour ne sélectionner que les formations qui concernent les professionnels en ES ou ESMS (cf photo ci-après).

Autres thématiques (3/4)

Rechercher une action

Nom ou sigle organisme

Référence de l'action (11 chiffres)

Professions

Infirmier ×

Professions

Spécialité(s)

Année(s) de réalisation

2023 ×

2024 ×

Année(s) de réalisation

Mot(s) clé(s)

vaccination

Région(s)

Pays de la Loire

Date

×



Mode(s) d'exercices

Autre salariés ×

Mode(s) d'exercices

×



Type(s) d'action

Format de DPC

Autres thématiques (4/4)

Outils

Question : Où les IDE peuvent faire la formation pour prescrire la vaccination ?

Réponse : Dans des organismes privés et universitaires qui peuvent proposer la formation aux infirmiers ou aux pharmaciens afin de leur permettre de prescrire une vaccination.

.....

Question : Les référents hygiène des établissements formés par le CPIas peuvent-ils être un appui pour la promulgation de la vaccination dans les ESMS ?

Réponse : Toute personne support formée sur la vaccination peut promouvoir dans son établissement la vaccination auprès de ses collègues et des résidents.