

Caroline DANGLA/Patrick DUCHEIN
CPias Occitanie



Cible

- Professionnels soignants en ESMS (mais aussi ES)
- Etudiants paramédicaux
- Usagers

Temps de jeu



- 30 secondes par question
- De 10mn à plusieurs heures cela dépend de l'objectif poursuivit par le maitre du jeu
- Au total, environ 30 min de jeu pour la version en ligne

Objectifs pédagogiques

- Mobilisation des connaissances des professionnels sur une **pathologie** et son **mode de transmission**.
- Mobilisation des connaissances des professionnels sur les **PS** et les **mesures de prévention**.
- Recontextualisation des connaissances dans la **pratique professionnelle**.



Matériel

- 1 paquet de 11 cartes Pathologies
- 1 paquet de 7 cartes Situations à risque
- 4 paquets de 19 cartes Boucliers
- 4 paquets de 3 cartes Transmissions



Matériel


1 règle du jeu



1 plateau de jeu



1 grille de jeu



1 aide-mémoire

Aide-mémoire pour la mise en place des précautions complémentaires associées aux Précautions Standard en ESMS										
Désignation de la pathologie	Précautions Standard	Chambre recommandée	Précautions complémentaires		Hygiène des mains	Précautions pour les résidents	Précautions pour les visiteurs	Bien-être / Gestion des excréta	Personnes à contacter	Durée des mesures / Mesures particulières
			Type	EPI associés						
BMR Bactérie Multi-Résistante aux Antibiotiques	PAR TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, POUR TOUT SOIN, EN TOUT LIEU, POUR TOUT RÉSIDENT, QUEL QUE SOIT SON STATUT INFECTUEUX	✓						Entretien quotidien avec d/D : surfaces hautes, objets reliés, sanitaires et sol	Avis EMH « Avis référent en antibiothérapie » avant prescription ATB (EMA)	Pas de prélèvement de contrôle Informez le service ou structure si hospitalisation et ou consultation
BHR Bactérie Résistante aux Antibiotiques	Hygiène des mains par solution hydro-alcoolique • A l'entrée et à la sortie de la chambre, • Avant tout geste propre, • Après tout geste sale • Avant et après port de gants EPI associés aux Précautions Standard : Contactants liquides biologiques et mains lavées Prélèvements de sang, solette isolée...	✓						Entretien quotidien avec d/D : surfaces hautes, objets reliés, sanitaires et sol Gestion des excréta : Lavez BMR-BHR en EMH - Mode 2 (solette)	Avis EMH pour analyser le risque « Avis référent en antibiothérapie » avant prescription ATB (EMA)	Accompagner et évaluer le respect des Précautions Standard Informez le service ou structure si hospitalisation et ou consultation
Infection à Clostridielles difficile	Soins moussants/antistatiques Tousses, éternuements et autres soins à risque Gestes à risque de projection et/ou d'aérosolisation Ponctions, prélèvements, piqûres, tests respiratoires... en gelique dynamique	✓						Entretien quotidien avec d/D sporicide (norme EN12768) : surfaces hautes, objets reliés, sanitaires et sol Gestion des excréta : Cas d/D	Avis EMH « Avis référent en antibiothérapie » avant prescription ATB (EMA) EMH pour analyse du risque et conduite à tenir	48 à 72 h après arrêt d'antibiotique Un mois 3 sécher hygiène 24 h Pas de prélèvement de contrôle (recherche CDI en absence de diarrhée)
Conjonctivite virale	Déchets d'activité de soins non recyclables sauf objets profonds A conditionner avant sortie de la chambre	✓						Entretien quotidien avec d/D virucide (norme N4470) : surfaces hautes, objets reliés, sanitaires et sol	Si cas groupés, contacter EMH pour investigation	Jusqu'à guérison
IRA : Infection Respiratoire Aiguë Coronavirus / Grippe / VRS	Pour les infections à prévention vaccinale	✓						Entretien quotidien avec d/D virucide (norme N4470) : surfaces hautes, objets reliés, sanitaires et sol Cas groupés IRA	EPS PA et EMH : pour analyse du risque et conduite à tenir	7 jours et au moins 48h sans symptômes


1 diplôme



Où trouver le jeu ?

Sur le site internet du CPias Occitanie :

<https://cpias-occitanie.fr/outils-cpias-occitanie/>



Outils pédagogiques

Apprentissage des précautions standard et complémentaires par le jeu

- Les Hygieners (2023)

La prévention du risque infectieux par l'Escape Game

- Dépasser l'hésitation vaccinale (MAJ sept. 2024)
- Scénarios grippe, gale et rougeole (2021)

Version en ligne !



Préambule

Bienvenue dans l'univers des Hygiéniers !
Ce jeu est conçu essentiellement pour les professionnels des établissements médico-sociaux.

Il a pour but de :

- Mobiliser vos connaissances professionnelles sur les Précautions Standard (PS)
- Adopter les bonnes mesures de prévention
- Mobiliser vos connaissances professionnelles sur un certain nombre de pathologies

Légende

Code couleur de l'argumentaire :

- Bonne réponse
- Seulement dans certaines situations
- Mauvaise réponse

Pour chaque question vous disposez de 30 sec pour répondre !

Durée totale du module : environ 30 min

Cette icône vous permet de visualiser votre score

Si vous quittez la partie en cours, pour rejouer vous devez utiliser un nouveau pseudo !

SUIVANT →

Toilette au lit

Sélectionnez les boucliers à utiliser systématiquement dans le cadre d'une toilette au lit

Vous pouvez sélectionner plus d'une réponse

00:30 Envoyer

Hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique

- A l'entrée et à la sortie de la chambre
- Avant tout geste
- Avant l'enfilage et après le retrait des gants

Protéger sa tenue (soin mouillant)

L'éliminer dès la fin de la toilette suivi d'une friction à la SHA

Entretien de l'environnement à la fin de la toilette

- Surfaces et objets fréquemment en contact avec les mains, le matériel ayant servi pour la toilette et le matelas avant de refaire le lit avec un détergent/ désinfectant(dD)
- Vider sans éclabousser l'eau usagée dans les WC (pour éviter de contaminer les siphons des lavabos et des douches)
- Entretien de la baignoire : avec un détergent / désinfectant (dD) ou au lave-bassin

Port de gants non systématique

Sauf :

- Toilette intime
- Toute autre partie du corps du résident visuellement souillée
- Si la peau du soignant ou du résident est lésée

Ne pas utiliser sur la peau saine
Les retirer dès la fin du soin suivi d'une friction avec la SHA

Le port du masque et de la surblouse sont des mesures complémentaires qu'il conviendra de porter en fonction de la situation infectieuse du résident.
Rappel : port du masque obligatoire si vous présentez des symptômes respiratoires