Indicateurs de pertinence de l'utilisation des antibiotiques en population pédiatrique

Pascal THIBON, Willy BOUTFOL, Marianne DELESTRE, Pauline LAUNAY,
Léa MESSIDOR, Emmanuel PIEDNOIR

44^e
RÉUNION
INTERDISCIPLINAIRE
DE CHIMIOTHÉRAPIE
ANTI-INFECTIEUSE

LUNDI 16 & MARDI 17
DÉCEMBRE 2024

palaisdescongrès
deparis

Intervenant : Emmanuel PIEDNOIR, Avranches-Granville

Je n'ai pas de lien d'intérêt potentiel à déclarer

Introduction : prescriptions d'ATB en ville

Prescriptions d'antibiotiques en médecine de ville : stabilisation en 2023

Source : Rapport « Consommation d'antibiotiques en secteur de ville en France, 2013-2023 »

Prescriptions d'antibiotiques de 2013 à 2023 pour 1 000 habitants et par an

Sources : Données SNDS. Analyse Santé publique France

Prescriptions d'antibiotiques en 2023 par mois et par classe d'âges

Prescriptions d'antibiotiques pour 3 spécialités médicales entre 2013 et 2023

Sources : Données SNDS. Analyse Santé publique France

Introduction : indicateurs de pertinence

- Indicateurs de pertinence de l'utilisation des antibiotiques (**ATB**)
 - Proxy-indicateurs (**PI**)
 - Adéquation prescriptions <-> recommandations + **cibles** à atteindre
 - Complémentaires des indicateurs quantitatifs
 - Proviennent des **données de remboursement de l'Assurance Maladie (SNDS)**
- 3 propriétés clinimétriques : mesurabilité, applicabilité et le potentiel d'amélioration

PI définis en soins primaires

PI	PI en soins primaires	Cible optimale	Cible acceptable
Favoriser les antibiotiques de première intention			
PI 1	Prescriptions d'amoxicilline sur prescriptions d'antibiotiques de seconde intention	>3	
PI 2	Prescriptions d'amoxicilline sur prescriptions d'amoxicilline-acide clavulanique	>3	
PI 3	Prescriptions d'antibiotiques non indiqués (moxifloxacine, spiramycine-metronidazole, cefaclor)	0%	<0,5%
PI 4	Prescriptions de pristinamycine et macrolides	<5%	<10%
PI 5	Prescriptions répétées de quinolones	0%	<10%
PI 6	Prescriptions d'antibiotiques pour infections urinaires chez l'homme	0%	<0,5%
PI 7	Prescriptions antibiotiques pour infections urinaires chez la femme	>5%	
Prescrire à bon escient			
PI 8	Variations saisonnières des prescriptions totales d'antibiotiques	>20%	
PI 9	Variations saisonnières des prescriptions de quinolones	<5%	<10%
PI 10	Durée estimée de prescriptions antibiotiques >7 jours	5%	<10%
Éviter les prescriptions d'anti-inflammatoires en cas d'infections			
PI 11	Co-prescriptions d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	0%	<5%
PI 12	Co-prescriptions d'antibiotiques et de corticoïdes systémiques	0%	<5%

PI définis pour les EHPAD

PI	PI en EHPAD	Cible optimale	Cible acceptable
PI 1	Infection urinaire masculine : (nitrofurantoïne, fosfomycine-trométamol, pivmecillinam, amoxicilline ou amoxicilline/acide clavulanique) / (fluoroquinolones, céphalosporines ou sulfaméthoxazole triméthoprimé)	0	<0,2
PI 2	Infection urinaire de la femme : (nitrofurantoïne, fosfomycine-trométamol, pivmecillinam) / (fluoroquinolones)	>1,5	
PI 3	Re-prescription de quinolones	0%	<10%
PI 4	Variation saisonnière des prescriptions d'antibiotiques	<20%	
PI 5	Variation saisonnière des prescriptions d'amoxicilline/acide clavulanique	<20%	
PI 6	Ratio antibiotiques de 1ère intention vs antibiotiques de 2ème intention	>1,5	
PI 7	Nombre de prescriptions > 7 jours	5%	<20%
PI 8	Co-prescription d'antibiotiques et d'AINS	0%	<5%
PI 9	Vaccination anti-grippale	≥90%	
PI 10	Prescription de céphalosporines orales	<10%	<30%

PI : exemple

Données sur la prescription d'antibiotiques chez les médecins généralistes

Présentation

Proxy-indicateurs

Méthodologie

Mentions légales

Type de visualisation :

Niveau de l'indicateur

Proxy-indicateur :

Indicateur 2 : Prescriptions d'amoxicilline sur prescriptions d'amoxicilline-acide clavulanique

Année :

Comparaison des années

Caractéristiques des patients :

Tous patients

Type de graphique

Ligne

Barres

Graphiques

Carte

Tableau

Objectif méthodologique

Réaliser une **revue structurée de la littérature** pour identifier les **PI spécifiques à la population pédiatrique**, première étape de la démarche DELPHI

Revue structurée : méthode

- Méthode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)
- Equation de recherche
 - Inspirée des travaux réalisés pour la population adulte
- Recherche dans Medline
 - 10 dernières années
- Sélection des abstracts
 - 2 personnes, indépendamment (WB / PT)
 - Désaccords : 2 autres personnes (EP / MD)
- Sélection des articles
 - Idem + ajout de références à partir de la **biblio** et des **citations** des articles sélectionnés

Equation de recherche

Concept 1 Antibiotics	Concept 2 Usage	Concept 3 Metrics	Concept 2 Outpatient setting
Anti-infective agents [MeSH] Antibiotic prophylaxis [MeSH] Antibiotic* [tiab] Antiinfective* [tiab] Anti infective* [tiab] Antimicrobial* [tiab] Anti microbial* [tiab] Antibacterial* [tiab] Anti bacterial* [tiab]	Antibiotic consumption [tiab] Drug utilization [tiab] Drug utilisation [tiab] Antibiotic use [tiab] Antibiotic usage [tiab] Antimicrobial use [tiab] Antimicrobial usage [tiab] Antibacterial use [tiab] Antibacterial usage [tiab] Antibacterial prescribing [tiab] Antimicrobial prescribing [tiab] Antibiotic prescribing [tiab]	drug utilization review [MeSH] drug evaluation study [MeSH] point prevalence [tiab] Monitor* [tiab] surveillance [tiab] benchmarking [tiab] DDD [tiab] PDD [tiab] duration of treatment/therapy [tiab] prescribed daily dose* [tiab] Defined daily dose* [tiab] days of therapy [tiab] prescribing volume* [tiab] Quantity indicator/measure [tiab] Quantitative measure*/indicators [tiab]	Primary health care [MeSH] Community health centers [MeSH] Ambulatory care facilities [MeSH] Outpatient* [MeSH] General practic* [MeSH] Ambulatory care [MeSH] Primary Care/Healthcare [tiab] Community [tiab] Non-hospital* [tiab] Family physician* [tiab] Family practice [tiab] Clinic* [tiab]

+ Filtres : enfants + 10 dernières années

Revue structurée : résultats

*travail de thèse

** non adaptés pour la France¹¹

Résultats : 13 PI

- **5 « index »**

- **1** – Index amoxicilline
- **2** – Index azithromycine
- **3** – Index (céphalosporines ou macrolides)
- **4** – Index quinolones
- **5** – Index C3G

- **4 ratios**

- **6** – Ratio amoxicilline / amoxicilline + acide clavulanique
- **7** – Ratio amoxicilline / ATB de deuxième ligne
- **8** – Ratio spectre large/spectre étroit
- **9** – Ratio 1^{ère} ligne / ATB avec potentiel de sélection

- **4 autres**

- **10** – Co-prescriptions antibiotiques + AINS
- **11** – Co-prescriptions antibiotiques + corticostéroïdes
- **12** – Proportion d'antibiothérapies de 7 jours ou moins
- **13** – Variations saisonnières des prescriptions ATB totales

INDEX

Proportion d'utilisation d'une ou plusieurs classes d'antibiotiques – L'interprétation dépend de la classe d'ATB

RATIOS

Plus le ratio est élevé, plus l'utilisation de molécules à moindre impact est fréquente

PI 1 : index amoxicilline *(6 références)*

- **Définition**

- Nombre de prescriptions d'amoxicilline / nombre total de prescriptions d'antibiotiques.

- **Rationnel**

- Marqueur de prescription d'antibiotique adaptée, à spectre étroit
- Amoxicilline : 1^{ère} ligne pour la majorité des infections respiratoires aiguës nécessitant une antibiothérapie

- **Valeur cible ?**

- 50% (*Piovani D, BMJ Paediatrics Open 2017*)

Index amoxicilline : variable selon les pays

- 70 middle-income et high-income countries
- Access ATB : first-line or second-line, for key infections
- Amox index :
 - Median 30,7% [IQR 14,3-47,3]
 - Highest : Belgium = 69,8%
 - 11 countries < 10%
 - France : 55%

Figure 2: Country-level amoxicillin and access percentages grouped by high-income and middle-income countries
 The amoxicillin percentage (percentage of CAF standard units of antibiotic used accounted for by amoxicillin) corresponds to the amoxicillin index.
 CAF=child-appropriate formulation.

Index amoxicilline : variable selon les prescripteurs

ED : emergency departement

UCC : urgent care centers

PCC = primary care clinics

Telehealth : virtual visits

- USA : 3,61 M de consultations pour infection respiratoire aiguë

Index amoxicilline : variable selon les prescripteurs

Type of paediatrician	Indicator A*			% Yes
	No	Yes	Total	
Low prescriber	121	30	151	19.9
Mean prescriber	751	107	858	12.5
High prescriber	143	12	155	7.7
Total	1015	149	1164	12.8
p Value‡				0.002

- Italie (Lombardie) – 1164 pédiatres
- Amox index : 21,1% [IQR : 9%-37%]
- % de pédiatres atteignant la valeur cible de 50% : **12,8%**
- Meilleurs résultats chez les faibles prescripteurs

Index C3G (*ROSP*)

- **Définition**

- Part des patients MT traités par céphalosporine de 3^e ou 4^e génération parmi ceux traités par antibiotiques

- **Rationnel**

- Limitation des molécules les plus génératrices d'antibiorésistance : essentiellement les C3G chez l'enfant

- **Valeur cible**

- < 4 ans : $\leq 11\%$
- ≥ 4 ans : $\leq 7\%$

Index C3G (ROSP)

	Indicateurs	Résultats à	Evol. en points 2021 - 2022						
		fin déc. 2016	fin déc. 2017	fin déc. 2018	fin déc. 2019	fin déc. 2020	fin déc. 2021	fin déc. 2022	
PREVENTION	Vaccination								
	2 doses vaccin ROR chez enfants de - 2 ans	75,7%	78,1%	83,1%	84,3%	85,9%	87,0%	86,3%	-0,7
	1 dose vaccin antiméningocoque C enfants - 18 mois	75,3%	80,5%	89,2%	95,1%	97,4%	98,0%	98,2%	0,2
	Antibiorésistance								
	Part des C3 ou C4 des enfants de - 4 ans traités par antibiotiques	34,0%	27,0%	24,1%	21,3%	20,1%	20,5%	22,1%	1,7
	Part des C3 ou C4 des enfants de + 4 ans traités par antibiotiques	22,8%	19,3%	17,2%	15,2%	14,1%	14,6%	14,9%	0,3

< 4 ans : 34,0% en 2016 -> 22,1% en 2022

≥ 4 ans : 22,8% en 2016 -> 14,9% en 2022

https://www.assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/2023-04-28-%20CP-r%C3%A9sultats-Rosp%202022_0.pdf

Ratio amoxicilline / AAC (*1 référence*)

- **Définition**

- Prescriptions d'amoxicilline / prescriptions d'amoxicilline acide clavulanique

- **Rationnel**

- Les recommandations privilégient l'amoxicilline en première intention

- **Valeur cible ?**

- A déterminer par le groupe d'expert (même que les adultes ?)

Di Mario S, Acta Paediatr. 2018

Ratio amoxicilline / AAC

Figure 1 Trends of antibiotic prescription rates and ratio of amoxicillin to amoxicillin-clavulanic acid in children 0–13 years old (Emilia-Romagna Region, 2005–2016).

- Italie (Emilia-Romagnia)
- Intervention : ProBA project, ≥ 2007
 - Guidelines
 - Audit and feedback
 - Public campaigns (2014)
 - ...
- Augmentation significative du ratio amox/AAC (+78%)

Discussion

- Revue structurée de la littérature : 13 PI identifiés
- > **Validation par procédure de consensus formalisée de type Delphi modifiée**
 - Comité scientifique et d'organisation
 - DRSM Grand-Est, Pays-de-Loire et Normandie
 - Université de Lorraine, laboratoire INSPIIRE
 - Equipe PRIMO-BUA
 - Comité d'experts en cours de constitution
 - Réseau des MG des CRAtb/EMA
 - SPILF
 - CMG
 - GPIP
 - URPS médecine générale
 - ...

Méthode Delphi

- 2 tours de cotation
- Cotation de chaque indicateur et proposition de valeurs cibles (globales ou par classe d'âge)

Figure 1. Flowchart of the RAND-modified Delphi consensus procedure. PI, proxy indicator.

Procédure pour les indicateurs en médecine générale

Discussion - Conclusion

- Population ciblée
 - Prescripteurs
 - MG et pédiatres
- Perspective
 - Rendu sous forme de profils de prescription
 - Amélioration des pratiques !
 - Validation en 2025 après les tours DELPHI