
Réseau piloté par Santé publique France

RéPIA PRIMO

SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN VILLE ET EN EHPAD
ANNÉE 2025



RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES


LES DONNÉES SONT ISSUES DE

318 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE SUR 486

- Laboratoire participant à PRIMO
- Laboratoire ne participant pas à PRIMO


ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

- 157 604 ANTIBIOGRAMMES D'ENTÉROBACTÉRIES
- 155 874 ANTIBIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES
- LES RÉSULTATS PAR SEXE CONCERNENT LES 18 ANS ET PLUS



Répartition des antibiogrammes urinaires selon les espèces d'entérobactéries
(n = 155 874)

** Klebsiella oxytoca, Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae complex*




Répartition des antibiogrammes d'entérobactéries selon le prélèvement
(n = 157 604)


Réseau piloté par Santé publique France
RéPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES *Escherichia coli* (urines)

CHEZ LA FEMME



CHEZ L'HOMME



LES MESSAGES DE BON USAGE

- **Fosfomycine, pivmécillinam et nitrofurantoïne** Faible taux de résistance autorisant leur utilisation en 1e intention dans les **cystites féminines et masculines** (mauvaise diffusion rénale).
- **Amoxicilline :** non utilisable en probabiliste en raison de résistances fréquentes, mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe (notamment en cas de **cystite féminine ou masculine ou de pyélonéphrite**).

- C3G (Céphalosporines 3e génération) : utilisation réservée à une **utilisation probabiliste dans les pyélonéphrites et prostatites** du fait de leur large spectre.
- FQ (Fluoroquinolones) : **éviter les FQ en traitement probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois.** Utilisation possible dans les prostatites, 4e option antibiotique par ordre de préférence dans les pyélonéphrites documentées.

Réseau piloté par Santé publique France
RéPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES

Escherichia coli (urines)

C3G

Céphalosporines 3ème génération
(Céfotaxime ou ceftriaxone ou ceftazidime)

Départements	Effectifs Ville
Ain	4523
Allier	2827
Ardèche	3839
Cantal	1125
Drôme	4298
Haute-Loire	1467
Haute-Savoie	16444
Isère	25473
Loire	14265
Puy-de-Dôme	12297
Rhône	30244
Savoie	6446

FQ


Fluoroquinolones

À DOMICILE

5,1%

RÉGION 4,7%


Cible 2027 <3%



9,0%

RÉGION 8,0%

Cible 2027 <10%




EN EHPAD

10,0%

RÉGION 8,3%


Cible 2027 <8%



11,6%

RÉGION 9,0%

Cible 2027 <18%



Départements	Effectifs Ehpad
Ain	304
Allier	256
Ardèche	304
Cantal	208
Drôme	125
Haute-Loire	152
Haute-Savoie	607
Isère	941
Loire	1525
Puy-de-Dôme	903
Rhône	1980
Savoie	402

Réseau piloté par
RéPIA PRIMO
Santé publique France

LIENS UTILES

Lien vers le site RéPIA - PRIMO

Surveillance de la résistance aux antibiotiques

Prévention de la résistance aux antibiotiques

Prévention des infections associées aux soins

Lien vers le site CRAtb Auvergne-Rhône-Alpes

Structure publique régionale d'expertise et d'appui aux professionnels de santé pour un meilleur usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance

