Réseau piloté par Santé publique France

RÉPIA PRIMO

SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN VILLE ET EN EHPAD
ANNÉE 2025



RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE


LES DONNÉES SONT ISSUES DE

66 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE SUR 136

- Laboratoire participant à PRIMO
- Laboratoire ne participant pas à PRIMO


ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

- 36 017 ANTIBIOGRAMMES D'ENTÉROBACTÉRIES
- 35 662 ANTIBIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES
- LES RÉSULTATS PAR SEXE CONCERNENT LES 18 ANS ET PLUS



Répartition des antibiogrammes urinaires selon les espèces d'entérobactéries
(n = 35 662)

** Klebsiella oxytoca, Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae complex*




Répartition des antibiogrammes d'entérobactéries selon le prélèvement
(n = 36 017)


Réseau piloté par Santé publique France
RÉPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES *Escherichia coli* (urines)

CHEZ LA FEMME



CHEZ L'HOMME



LES MESSAGES DE BON USAGE

- **Fosfomycine, pivmécillinam et nitrofurantoïne** Faible taux de résistance autorisant leur utilisation en 1e intention dans les **cystites féminines et masculines** (mauvaise diffusion rénale).
- **Amoxicilline :** non utilisable en probabiliste en raison de résistances fréquentes, mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe (notamment en cas de **cystite féminine ou masculine ou de pyélonéphrite**).

- C3G (Céphalosporines 3e génération) : utilisation réservée à une **utilisation probabiliste dans les pyélonéphrites et prostatites** du fait de leur large spectre.
- FQ (Fluoroquinolones) : **éviter les FQ en traitement probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois.** Utilisation possible dans les prostatites, 4e option antibiotique par ordre de préférence dans les pyélonéphrites documentées.

Réseau piloté par Santé publique France
RéPIA PRIMO


RÉSISTANCES OBSERVÉES — *Escherichia coli* (urines)

C3G
Céphalosporines 3ème génération
(Céfotaxime ou ceftriaxone ou ceftazidime)

À DOMICILE

5,1%

RÉGION 4,1%



Cible 2027 <3%


Pas de données suffisantes
[0%-2,5%]
]2,5%-5%]
]5%-10%]
]10%-20%]
]20%+

Départements	Effectifs Ville
Cher	1322
Eure-et-Loir	1642
Indre	3181
Indre-et-Loire	11455
Loiret	7223
Loir-et-Cher	3612

EN EHPAD

10,0%

RÉGION 7,0%



Cible 2027 <8%


Pas de données suffisantes
[0%-2,5%]
]2,5%-5%]
]5%-10%]
]10%-20%]
]20%+

Départements	Effectifs Ehpad
Cher	131
Eure-et-Loir	165
Indre	459
Indre-et-Loire	584
Loiret	311
Loir-et-Cher	151

FQ
Fluoroquinolones

9,0%

RÉGION 7,2%




Cible 2027 <10%

Pas de données suffisantes
[0%-10%]
]10%-15%]
]15%-20%]
]20%-30%]
]30%+

11,6%

RÉGION 10,9%



Cible 2027 <18%

Pas de données suffisantes
[0%-10%]
]10%-15%]
]15%-20%]
]20%-30%]
]30%+

Réseau piloté par RéPIA PRIMO Santé publique France

LIENS UTILES

RéPIA PRIMO

Lien vers le site RéPIA - PRIMO

Surveillance de la résistance aux antibiotiques

Prévention de la résistance aux antibiotiques

Prévention des infections associées aux soins

CRAtb
CENTRE RÉGIONAL EN ANTIBIOTHÉRAPIE
CENTRE VAL DE LOIRE

Lien vers le site du CRATB Centre-Val de Loire

Structure publique régionale d'expertise et d'appui aux professionnels de santé pour un meilleur usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance

