
Réseau piloté par Santé publique France

RÉPIA PRIMO

SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN VILLE ET EN EHPAD
ANNÉE 2025



RÉGION HAUTS-DE-FRANCE


LES DONNÉES SONT ISSUES DE

140 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE SUR 356

Laboratoire participant à PRIMO
Laboratoire ne participant pas à PRIMO


ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

- 75 776 ANTIBIOGRAMMES D'ENTÉROBACTÉRIES
- 74 675 ANTIBIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES
- LES RÉSULTATS PAR SEXE CONCERNENT LES 18 ANS ET PLUS



Répartition des antibiogrammes urinaires selon les espèces d'entérobactéries
(n = 74 675)

** Klebsiella oxytoca, Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae complex*




Répartition des antibiogrammes d'entérobactéries selon le prélèvement
(n = 75 776)


Réseau piloté par Santé publique France
RÉPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES *Escherichia coli* (urines)

CHEZ LA FEMME



CHEZ L'HOMME



LES MESSAGES DE BON USAGE

- **Fosfomycine, pivmécillinam et nitrofurantoïne** Faible taux de résistance autorisant leur utilisation en 1e intention dans les **cystites féminines et masculines** (mauvaise diffusion rénale).
- **Amoxicilline :** non utilisable en probabiliste en raison de résistances fréquentes, mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe (notamment en cas de **cystite féminine ou masculine ou de pyélonéphrite**).

- C3G (Céphalosporines 3e génération) : utilisation réservée à une **utilisation probabiliste dans les pyélonéphrites et prostatites** du fait de leur large spectre.
- FQ (Fluoroquinolones) : **éviter les FQ en traitement probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois.** Utilisation possible dans les prostatites, 4e option antibiotique par ordre de préférence dans les pyélonéphrites documentées.

Réseau piloté par Santé publique France
RéPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES


Escherichia coli (urines)


À DOMICILE

C3G
Céphalosporines 3ème génération
(Céfotaxime ou ceftriaxone ou ceftazidime)

5,1%

RÉGION 4,8%






Cible 2027 <3%


Départements	Effectifs Ville
Aisne	1840
Nord	27874
Oise	7316
Pas-de-Calais	16453
Somme	4212

FQ
Fluoroquinolones

9,0%

RÉGION 8,6%







Cible 2027 <10%

EN EHPAD

10,0%

RÉGION 13,9%







Cible 2027 <8%

11,6%

RÉGION 14,0%





Cible 2027 <18%

Départements	Effectifs Ehpad
Aisne	123
Nord	2157
Oise	260
Pas-de-Calais	885
Somme	397

Réseau piloté par RéPIA PRIMO Santé publique France

LIENS UTILES

Lien vers le site RéPIA - PRIMO

Surveillance de la résistance aux antibiotiques

Prévention de la résistance aux antibiotiques

Prévention des infections associées aux soins

Lien vers le site CRAtb Hauts-de-France

Structure publique régionale d'expertise et d'appui aux professionnels de santé pour un meilleur usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance

