


# RÉSISTANCES OBSERVÉES

## *Escherichia coli (urines)*

### CHEZ LA FEMME




- Fosfomycine, mécillinam, nitrofuranes ≤10% de résistances : utilisables en probabiliste dans les cystites
- Amoxicilline : reste actif pour 50% des souches urinaires isolées chez les femmes.

Pas utilisable en probabiliste mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe

\*\* C3G et FQ : utilisation réservée aux pyélonéphrites, à adapter à réception de l'antibiogramme


### CHEZ L'HOMME



- C3G à privilégier en probabiliste sur les formes graves
- Les FQ sont les molécules de référence du fait de leur excellente diffusion
- Eviter les FQ en probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois**
- \* Pour les FQ, prévenir le patient des effets indésirables ([note Ansm d'août 2023](#))
- Cotrimoxazole : pas utilisable en probabiliste mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe



**SELON L'HÉBERGEMENT  
CHEZ LES > 65 ANS**



# RÉSISTANCES OBSERVÉES

## *Escherichia coli (urines)*

### À DOMICILE



**RÉGION**  
6,8%

Cible 2025  
<3%

### EN EHPAD



**RÉGION**  
23,1%


Cible 2025  
<8%

### C3G

Céphalosporines  
3ème génération

Départements	Effectifs Ville
Essonne	4255
Hauts-de-Seine	12345
Paris	14696
Seine-et-Marne	11095
Seine-Saint-Denis	5920
Val-de-Marne	7168
Val-d'Oise	5948
Yvelines	3126

- Pas de données suffisantes
- [0%-2,5%]
- [2,5%-5%]
- [5%-10%]
- [10%-20%]
- [20%+]




### FQ

Fluoroquinolones

**RÉGION**  
17,0%

Cible 2025  
<10%

- Pas de données suffisantes
- [0%-10%]
- [10%-15%]
- [15%-20%]
- [20%-30%]
- [30%+]




**RÉGION**  
27,8%

Cible 2025  
<18%

Départements	Effectifs Ehpad
Essonne	25
Hauts-de-Seine	162
Paris	53
Seine-et-Marne	97
Seine-Saint-Denis	45
Val-de-Marne	76
Val-d'Oise	121
Yvelines	24


- Pas de données suffisantes
- [0%-10%]
- [10%-15%]
- [15%-20%]
- [20%-30%]
- [30%+]



# RÉSISTANCES OBSERVÉES

## *Klebsiella pneumoniae (urines)*


### CHEZ LA FEMME



• Amoxicilline : résistance naturelle

\*\* C3G et FQ : utilisation réservée aux pyélonéphrites, à adapter à réception de l'antibiogramme


### CHEZ L'HOMME



- C3G à privilégier en probabiliste sur les formes graves
- Les FQ sont les molécules de référence du fait de leur excellente diffusion
- \* **Eviter les FQ en probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois**
- \* Pour les FQ, prévenir le patient des effets indésirables ([note Ansm d'août 2023](#))
- Cotrimoxazole : pas utilisable en probabiliste mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe





SELON L'HÉBERGEMENT  
CHEZ LES > 65 ANS





## RÉSISTANCES OBSERVÉES

## ***Klebsiella pneumoniae* (urines)**

## À DOMICILE



 EN EHPAD



Départements	Effectifs Ville
Essonne	660
Hauts-de-Seine	1794
Paris	2247
Seine-et-Marne	1664
Seine-Saint-Denis	1177
Val-de-Marne	1178
Val-d'Oise	963
Yvelines	436

Départements	Effectifs	Ehpad
Essonne	7	
Hauts-de-Seine	21	
Paris	3	
Seine-et-Marne	19	
Seine-Saint-Denis	13	
Val-de-Marne	27	
Val-d'Oise	24	
Yvelines	5	

## LIENS UTILES



### [Lien vers le site RéPIA - PRIMO](#)



Surveillance  
de la résistance  
aux antibiotiques



Prévention  
de la résistance  
aux antibiotiques



Prévention  
des infections  
associées aux soins



### [Lien vers le site CRATB Île-de-France](#)

Structure publique régionale d'expertise et d'appui aux professionnels de santé franciliens pour un meilleur usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance

