




## SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL



## RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN VILLE ET EN EHPAD ANNÉE 2024



## LES DONNÉES SONT ISSUES DE


25 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE SUR 68

### À LA RÉUNION


- Laboratoire participant à PRIMO
- Laboratoire ne participant pas à PRIMO

## ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

- 11 443 ANTI BIOGRAMMES D'ENTÉROBACTÉRIES
- 10 765 ANTI BIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES
- LES RÉSULTATS PAR SEXE CONCERNENT LES 18 ANS ET PLUS



\* *Klebsiella oxytoca*, *Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae complex*



# RÉSISTANCES OBSERVÉES

## *Escherichia coli* (urines)

### À DOMICILE


4,3%

RÉGION  
4,2%

Cible 2025  
<3%

**C3G**  
Céphalosporines 3ème  
génération  
(Céfotaxime ou ceftriaxone ou  
ceftazidime)

Département Effectifs Ville  
La Réunion 8048




10,8%

RÉGION  
18,8%

Cible 2025  
<10%

**FQ**  
Fluoroquinolones

Pas de données suffisantes  
[0%-10%]  
[10%-15%]  
[15%-20%]  
[20%-30%]  
[30%+]



### EN EHPAD

8,9%

RÉGION  
5,3%

Cible 2025  
<8%

Pas de données suffisantes  
[0%-2,5%]  
[2,5%-5%]  
[5%-10%]  
[10%-20%]  
[20%+]

Département Effectifs Ehpad  
La Réunion 133

14,2%

RÉGION  
20,3%

Cible 2025  
<18%


Pas de données suffisantes  
[0%-10%]  
[10%-15%]  
[15%-20%]  
[20%-30%]  
[30%+]




# RÉSISTANCES OBSERVÉES

## *Escherichia coli (urines)*

### CHEZ LA FEMME



### CHEZ L'HOMME



- C3G à privilégier en probabiliste sur les formes graves
- Les FQ sont les molécules de référence du fait de leur excellente diffusion dans les infections urinaires masculines fébriles mais prévenir le patient des effets indésirables ([note Ansm d'août 2023](#))
- Cotrimoxazole : bonne efficacité clinique en cas de sensibilité de la bactérie

- Fosfomycine, pivmécillinam, nitrofuranes : utilisables en probabiliste dans les cystites ([cf recos HAS/Spilf infections urinaires](#))
- Amoxicilline : > 50% de sensibilité des souches urinaires isolées chez les femmes. Bonne efficacité clinique en cas de sensibilité de la bactérie

**<sup>1</sup> Eviter les FQ en probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois**

**<sup>2</sup> C3G et FQ : utilisation réservée aux pyélonéphrites, le relais par une autre molécule est à adapter selon l'antibiogramme**



**SELON L'HÉBERGEMENT ET LE SEXE CHEZ LES > 65 ANS**

### ♀ CHEZ LES FEMMES




### ♂ CHEZ LES HOMMES



# RÉSISTANCES OBSERVÉES


## *Klebsiella pneumoniae* (urines)



# RÉSISTANCES OBSERVÉES


## *Klebsiella pneumoniae (urines)*

### CHEZ LA FEMME



- Amoxicilline : résistance naturelle

### CHEZ L'HOMME



- C3G à privilégier en probabiliste sur les formes graves
- Pour les FQ, prévenir le patient des effets indésirables ([note Ansm d'août 2023](#))
- Cotrimoxazole : bonne efficacité clinique en cas de sensibilité de la bactérie


<sup>1</sup> Eviter les FQ en probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois

<sup>2</sup> C3G et FQ : utilisation réservée aux pyélonéphrites, le relais par une autre molécule est à adapter selon l'antibiogramme




SELON L'HÉBERGEMENT ET LE SEXE CHEZ LES > 65 ANS

### ♀ CHEZ LES FEMMES



### ♂ CHEZ LES HOMMES



## LIENS UTILES



[Lien vers le site RéPIA - PRIMO](#)



Surveillance  
de la résistance  
aux antibiotiques



Prévention  
de la résistance  
aux antibiotiques



Prévention  
des infections  
associées aux soins



La Réunion

[Lien vers le site CRAtb La Réunion](#)

*Structure publique régionale d'expertise et d'appui aux professionnels de santé pour un meilleur usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance*

