




SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL



RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN VILLE ET EN EHPAD ANNÉE 2024



LES DONNÉES SONT ISSUES DE


197 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE SUR 376

EN RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

- Laboratoire participant à PRIMO
- Laboratoire ne participant pas à PRIMO


ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

- 90 656 ANTI BIOGRAMMES D'ENTÉROBACTÉRIES
- 89 812 ANTI BIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES
- LES RÉSULTATS PAR SEXE CONCERNENT LES 18 ANS ET PLUS



Répartition des antibiogrammes urinaires selon les espèces d'entérobactéries
(n = 89 812)

* *Klebsiella oxytoca*, *Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae complex*



Répartition des antibiogrammes d'entérobactéries selon le prélèvement
(n = 90 656)

RÉSISTANCES OBSERVÉES

Escherichia coli (urines)

À DOMICILE

4,3%


RÉGION
3,7%

Cible 2025
<3%

C3G
Céphalosporines 3ème
génération
(Céfotaxime ou ceftriaxone ou
ceftazidime)

Départements	Effectifs Ville
Charente	981
Charente-Maritime	7989
Corrèze	265
Creuse	304
Deux-Sèvres	9
Dordogne	8073
Gironde	23371
Haute-Vienne	12
Landes	5333
Lot-et-Garonne	5574
Pyrénées-Atlantiques	10520
Vienne	7740

- Pas de données suffisantes
- [0%-2,5%]
-]2,5%-5%]
-]5%-10%]
-]10%-20%]
-]20%+]




10,8%

RÉGION
8,8%

Cible 2025
<10%

FQ
Fluoroquinolones

- Pas de données suffisantes
- [0%-10%]
-]10%-15%]
-]15%-20%]
-]20%-30%]
-]30%+]



8,9%



RÉGION
8,2%

Cible 2025
<8%

14,2%

RÉGION
14,1%

- Pas de données suffisantes
- [0%-10%]
-]10%-15%]
-]15%-20%]
-]20%-30%]
-]30%+]




Départements	Effectifs Ehpad
Charente	82
Charente-Maritime	726
Corrèze	9
Creuse	118
Deux-Sèvres	83
Dordogne	755
Gironde	1104
Haute-Vienne	101
Landes	697
Lot-et-Garonne	546
Pyrénées-Atlantiques	1317
Vienne	402

Réseau piloté par


RÉSISTANCES OBSERVÉES

Escherichia coli (urines)

CHEZ LA FEMME



CHEZ L'HOMME



- C3G à privilégier en probabiliste sur les formes graves
- Les FQ sont les molécules de référence du fait de leur excellente diffusion dans les infections urinaires masculines fébriles mais prévenir le patient des effets indésirables ([note Ansm d'août 2023](#))
- Cotrimoxazole : bonne efficacité clinique en cas de sensibilité de la bactérie

- Fosfomycine, pivmécillinam, nitrofuranes : utilisables en probabiliste dans les cystites ([cf recos HAS/Spilf infections urinaires](#))
- Amoxicilline : > 50% de sensibilité des souches urinaires isolées chez les femmes. Bonne efficacité clinique en cas de sensibilité de la bactérie


¹ Eviter les FQ en probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois

² C3G et FQ : utilisation réservée aux pyélonéphrites, le relais par une autre molécule est à adapter selon l'antibiogramme




SELON L'HÉBERGEMENT ET LE
SEXE CHEZ LES > 65 ANS

♀ CHEZ LES FEMMES



♂ CHEZ LES HOMMES



RÉSISTANCES OBSERVÉES

Klebsiella pneumoniae (urines)


À DOMICILE

8,6%

RÉGION
8,1%

C3G
Céphalosporines 3ème génération
(Céfotaxime ou ceftriaxone ou ceftazidime)

Départements	Effectifs Ville
Charente	109
Charente-Maritime	989
Corrèze	38
Creuse	54
Deux-Sèvres	1
Dordogne	914
Gironde	2732
Haute-Vienne	0
Landes	705
Lot-et-Garonne	744
Pyrénées-Atlantiques	1398
Vienne	824




10,4%

RÉGION
9,3%

FQ
Fluoroquinolones

Pas de données suffisantes
[0%-10%]
[10%-15%]
[15%-20%]
[20%-30%]
[30%+]




EN EHPAD

22,3%

RÉGION
27,5%


Pas de données suffisantes
[0%-2,5%]
[2,5%-5%]
[5%-10%]
[10%-20%]
[20%+]



20,5%

RÉGION
24,0%

Pas de données suffisantes
[0%-10%]
[10%-15%]
[15%-20%]
[20%-30%]
[30%+]




Départements	Effectifs Ehpad
Charente	14
Charente-Maritime	106
Corrèze	1
Creuse	19
Deux-Sèvres	16
Dordogne	92
Gironde	180
Haute-Vienne	11
Landes	127
Lot-et-Garonne	67
Pyrénées-Atlantiques	264
Vienne	69

Réseau piloté par

RÉSISTANCES OBSERVÉES


Klebsiella pneumoniae (urines)

CHEZ LA FEMME



• Amoxicilline : résistance naturelle

CHEZ L'HOMME



- C3G à privilégier en probabiliste sur les formes graves
- Pour les FQ, prévenir le patient des effets indésirables ([note Ansm d'août 2023](#))
- Cotrimoxazole : bonne efficacité clinique en cas de sensibilité de la bactérie

¹ Eviter les FQ en probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois

² C3G et FQ : utilisation réservée aux pyélonéphrites, le relais par une autre molécule est à adapter selon l'antibiogramme




SELON L'HÉBERGEMENT ET LE
SEXE CHEZ LES > 65 ANS

♀ CHEZ LES FEMMES



♂ CHEZ LES HOMMES



LIENS UTILES



[Lien vers le site RéPIA - PRIMO](#)



Surveillance
de la résistance
aux antibiotiques



Prévention
de la résistance
aux antibiotiques



Prévention
des infections
associées aux soins



[Lien vers le site du
CRATB Nouvelle-Aquitaine](#)

Structure publique régionale d'expertise et d'appui aux professionnels de santé pour un meilleur usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance

