
Réseau piloté par Santé publique France

RÉPIA PRIMO

SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN VILLE ET EN EHPAD
ANNÉE 2025



RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE


LES DONNÉES SONT ISSUES DE

233 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE SUR 389

- Laboratoire participant à PRIMO
- Laboratoire ne participant pas à PRIMO


ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

- 97 576 ANTIBIOGRAMMES D'ENTÉROBACTÉRIES
- 96 681 ANTIBIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES
- LES RÉSULTATS PAR SEXE CONCERNENT LES 18 ANS ET PLUS



Répartition des antibiogrammes urinaires selon les espèces d'entérobactéries
(n = 96 681)

** Klebsiella oxytoca, Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae complex*




Répartition des antibiogrammes d'entérobactéries selon le prélèvement
(n = 97 576)


Réseau piloté par Santé publique France
RÉPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES *Escherichia coli* (urines)

CHEZ LA FEMME



CHEZ L'HOMME



LES MESSAGES DE BON USAGE

- **Fosfomycine, pivmécillinam et nitrofurantoïne** Faible taux de résistance autorisant leur utilisation en 1e intention dans les **cystites féminines et masculines** (mauvaise diffusion rénale).
- **Amoxicilline :** non utilisable en probabiliste en raison de résistances fréquentes, mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe (notamment en cas de **cystite féminine ou masculine ou de pyélonéphrite**).

- C3G (Céphalosporines 3e génération) : utilisation réservée à une **utilisation probabiliste dans les pyélonéphrites et prostatites** du fait de leur large spectre.
- FQ (Fluoroquinolones) : **éviter les FQ en traitement probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois.** Utilisation possible dans les prostatites, 4e option antibiotique par ordre de préférence dans les pyélonéphrites documentées.

Réseau piloté par RéPIA PRIMO Santé publique France

RÉSISTANCES OBSERVÉES

Escherichia coli (urines)

À DOMICILE


C3G
Céphalosporines 3ème génération
(Céfotaxime ou ceftriaxone ou ceftazidime)


Départements	Effectifs Ville
Charente	869
Charente-Maritime	14063
Corrèze	259
Creuse	305
Deux-Sèvres	12
Dordogne	8025
Gironde	23887
Haute-Vienne	7
Landes	5243
Lot-et-Garonne	5441
Pyrénées-Atlantiques	10247
Vienne	7077

*Nombre de souches < 50

5,1%

RÉGION 4,7%







Cible 2027 <3%

9,0%

RÉGION 7,6%






Cible 2027 <10%


FQ
Fluoroquinolones

EN EHPAD

10,0%

RÉGION 9,6%







Cible 2027 <8%

11,6%

RÉGION 9,4%





Cible 2027 <18%

Départements	Effectifs Ehpad
Charente	112
Charente-Maritime	1076
Corrèze	43
Creuse	104
Deux-Sèvres	34
Dordogne	565
Gironde	1085
Haute-Vienne	61
Landes	662
Lot-et-Garonne	386
Pyrénées-Atlantiques	1268
Vienne	639

*Nombre de souches < 50

Réseau piloté par RéPIA PRIMO Santé publique France

LIENS UTILES

RéPIA PRIMO

Lien vers le site RéPIA - PRIMO

Surveillance de la résistance aux antibiotiques

Prévention de la résistance aux antibiotiques

Prévention des infections associées aux soins

CRAtb
Centre Régional en Antibiothérapie de Nouvelle-Aquitaine

Lien vers le site du CRATB Nouvelle-Aquitaine

Structure publique régionale d'expertise et d'appui aux professionnels de santé pour un meilleur usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance



Réseau piloté par RéPIA PRIMO Santé publique France