
Réseau piloté par Santé publique France

RÉPIA PRIMO

SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN VILLE ET EN EHPAD
ANNÉE 2025



RÉGION OCCITANIE


LES DONNÉES SONT ISSUES DE

268 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE SUR 460

Laboratoire participant à PRIMO
Laboratoire ne participant pas à PRIMO


ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

- 104 003 ANTIBIOGRAMMES D'ENTÉROBACTÉRIES
- 103 182 ANTIBIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES
- LES RÉSULTATS PAR SEXE CONCERNENT LES 18 ANS ET PLUS



Répartition des antibiogrammes urinaires selon les espèces d'entérobactéries
(n = 103 182)

** Klebsiella oxytoca, Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae complex*




Répartition des antibiogrammes d'entérobactéries selon le prélèvement
(n = 104 003)


Réseau piloté par Santé publique France
RÉPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES *Escherichia coli* (urines)

CHEZ LA FEMME



CHEZ L'HOMME



LES MESSAGES DE BON USAGE

- **Fosfomycine, pivmécillinam et nitrofurantoïne** Faible taux de résistance autorisant leur utilisation en 1e intention dans les **cystites féminines et masculines** (mauvaise diffusion rénale).
- **Amoxicilline :** non utilisable en probabiliste en raison de résistances fréquentes, mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe (notamment en cas de **cystite féminine ou masculine ou de pyélonéphrite**).

- C3G (Céphalosporines 3e génération) : utilisation réservée à une **utilisation probabiliste dans les pyélonéphrites et prostatites** du fait de leur large spectre.
- FQ (Fluoroquinolones) : **éviter les FQ en traitement probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois.** Utilisation possible dans les prostatites, 4e option antibiotique par ordre de préférence dans les pyélonéphrites documentées.

Réseau piloté par Santé publique France
RéPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES

Escherichia coli (urines)

C3G
Céphalosporines 3ème génération
(Céfotaxime ou ceftriaxone ou ceftazidime)

Départements	Effectifs Ville
Ariège	3055
Aude	5700
Aveyron	50
Gard	16325
Gers	1821
Haute-Garonne	8014
Hautes-Pyrénées	2733
Hérault	24344
Lot	7
Lozère	1533
Pyrénées-Orientales	12782
Tarn	3636
Tarn-et-Garonne	278


FQ
Fluoroquinolones

À DOMICILE

5,1%

RÉGION 4,8%


Cible 2027 <3%



9,0%

RÉGION 9,8%

Cible 2027 <10%




EN EHPAD

10,0%

RÉGION 10,7%


Cible 2027 <8%



11,6%

RÉGION 13,0%

Cible 2027 <18%



Départements	Effectifs Ehpad
Ariège	261
Aude	205
Aveyron	249
Gard	688
Gers	139
Haute-Garonne	368
Hautes-Pyrénées	261
Hérault	1270
Lot	24
Lozère	189
Pyrénées-Orientales	566
Tarn	290
Tarn-et-Garonne	25

*Nombre de souches < 50

Réseau piloté par
RéPIA PRIMO
Santé publique France

LIENS UTILES

RéPIA PRIMO

Lien vers le site RéPIA - PRIMO

Surveillance de la résistance aux antibiotiques

Prévention de la résistance aux antibiotiques

Prévention des infections associées aux soins

CRAtb Occitanie

Centre Régional en Antibiothérapie

Lien vers le site CRAtb Occitanie

Structure publique régionale d'expertise et d'appui aux professionnels de santé pour un meilleur usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance

