
Réseau piloté par Santé publique France

RÉPIA PRIMO

SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN VILLE ET EN EHPAD
ANNÉE 2025



RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR


LES DONNÉES SONT ISSUES DE

368 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE SUR 647

Laboratoire participant à PRIMO
Laboratoire ne participant pas à PRIMO


ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

- 123 598 ANTIBIOGRAMMES D'ENTÉROBACTÉRIES
- 122 695 ANTIBIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES
- LES RÉSULTATS PAR SEXE CONCERNENT LES 18 ANS ET PLUS



Répartition des antibiogrammes urinaires selon les espèces d'entérobactéries
(n = 122 695)

** Klebsiella oxytoca, Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae complex*




Répartition des antibiogrammes d'entérobactéries selon le prélèvement
(n = 123 598)


Réseau piloté par Santé publique France
RÉPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES *Escherichia coli* (urines)

CHEZ LA FEMME



CHEZ L'HOMME



LES MESSAGES DE BON USAGE

- **Fosfomycine, pivmécillinam et nitrofurantoïne** Faible taux de résistance autorisant leur utilisation en 1e intention dans les **cystites féminines et masculines** (mauvaise diffusion rénale).
- **Amoxicilline :** non utilisable en probabiliste en raison de résistances fréquentes, mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe (notamment en cas de **cystite féminine ou masculine ou de pyélonéphrite**).

- C3G (Céphalosporines 3e génération) : utilisation réservée à une **utilisation probabiliste dans les pyélonéphrites et prostatites** du fait de leur large spectre.
- FQ (Fluoroquinolones) : **éviter les FQ en traitement probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois.** Utilisation possible dans les prostatites, 4e option antibiotique par ordre de préférence dans les pyélonéphrites documentées.

Réseau piloté par Santé publique France
RéPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES

Escherichia coli (urines)

C3G

Céphalosporines 3ème génération

(Céfotaxime ou ceftriaxone ou ceftazidime)

FQ


Fluoroquinolones

À DOMICILE

5,1%

RÉGION 7,8%

Cible 2027 <3%




Pas de données suffisantes
[0%-2,5%]
]2,5%-5%]
]5%-10%]
]10%-20%]
]20%+

Départements	Effectifs Ville
Alpes-de-Haute-Provence	124
Alpes-Maritimes	21371
Bouches-du-Rhône	35491
Hautes-Alpes	961
Var	25852
Vaucluse	8171

9,0%

RÉGION 11,1%

Cible 2027 <10%




Pas de données suffisantes
[0%-10%]
]10%-15%]
]15%-20%]
]20%-30%]
]30%+

EN EHPAD

10,0%

RÉGION 18,0%

Cible 2027 <8%




Pas de données suffisantes
[0%-2,5%]
]2,5%-5%]
]5%-10%]
]10%-20%]
]20%+

Départements	Effectifs Ehpad
Alpes-de-Haute-Provence	56
Alpes-Maritimes	1662
Bouches-du-Rhône	2178
Hautes-Alpes	157
Var	1042
Vaucluse	469

11,6%

RÉGION 20,0%

Cible 2027 <18%



Pas de données suffisantes
[0%-10%]
]10%-15%]
]15%-20%]
]20%-30%]
]30%+

Réseau piloté par RéPIA PRIMO Santé publique France

LIENS UTILES

RéPIA PRIMO

Lien vers le site RéPIA - PRIMO

Surveillance de la résistance aux antibiotiques

Prévention de la résistance aux antibiotiques

Prévention des infections associées aux soins

Mieux prescrire les antibiotiques PACATB

Lien vers le site du CRATB Provence-Alpes-Côte d'Azur

Structure publique régionale d'expertise et d'appui aux professionnels de santé pour un meilleur usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance

