Mission PRIMO
bp-primo@chu-nantes.fr

Indicateurs régionaux de résistance aux antibiotiques

en soins de Ville et en EHPAD

Réseau piloté par RéPIA PRIMO – Santé publique France

2025

Données à interpréter en fonction des effectifs et de l'évolution du réseau (n=58 816 souches de E.coli en ville et n=4497 en EHPAD)

Pays de la Loire

Escherichia coli-souches urinaires


Résistances aux Céphalosporines de 3e génération

En Ville

Votre région : 4,0%

↗ 2024 : 2,8%

Cible 2027 <3%



En EHPAD

Votre région : 5,2%

↗ 2024 : 4,7%

Cible 2027 <8%



Résistances aux Fluoroquinolones

En Ville

Votre région : 7,3%

↘ 2024 : 8,5%

Cible 2027 <10%




En EHPAD

Votre région : 7,3%

↘ 2024 : 9,8%

Cible 2027 <18%



Cible de la stratégie nationale 2022-2027 de prévention des infections et de l'antibiorésistance

Données de la France entière en 2025

Entérobactéries* productrices de carbapénèmases


En Ville

Votre région : 0,033%

↗ 2024 : 0,026%

Cible 2027 <0,5%





En EHPAD

Votre région : 0,000%

↘ 2024 : 0,023%

Cible 2027 <0,5%



* Entérobactéries = *E. coli* + *K. pneumoniae* + *E. cloacae*