Réseau piloté par

Surveillance de la Résistance bactérienne aux Antibiotiques en soins de ville et en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)

Région Corse
Résultats 2025

Données sous embargo jusqu'au 18/11/2026 – A usage interne professionnel


1. Présentation des données

25 laboratoires de biologie médicale en **Corse**

16 laboratoires participants soit **64,0%** de couverture

7289 antibiogrammes collectés dont **6723 d'urines** (93,6%)

Répartition des antibiogrammes par espèce (Tous prélèvements confondus)



Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

2. *Escherichia coli* : Résistance aux antibiotiques

Pourcentage de souches de *Escherichia coli* productrices de BLSE dans les prélèvements urinaires selon le type d'hébergement. Mission PRIMO, Région Corse, Résultats 2025.


	Patients vivant à domicile[1]		Patients vivant en Ehpad[1,2]	
Escherichia coli Urinaires	n	BLSE (n,%)	n	BLSE (n,%)
Corse	**5236**	**240 (4,6%)**	**236**	**44 (18,6%)**
Corse-du-Sud	723	43 (5,9%)	15	0*
Haute-Corse	4513	197 (4,4%)	221	44 (19,9%)

[1] Données issues de la mission PRIMO


[2] Données issues de la mission SPARES

* Nombre de souches < 50

Cartographie % BLSE – Patients vivant à domicile



Cartographie % BLSE – Patients vivant en Ehpad



Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Résistance aux antibiotiques (%) des souches de *Escherichia coli* isolées d'urines de patients vivant à domicile ou en Ehpad. Mission PRIMO, Région Corse, Résultats 2025.

Souches urinaires de *E. coli* Année 2025	Patients vivant à domicile[1] n = 5 236			Patients vivant en Ehpad[1,2] n = 236		
Antibiotiques testés	**n**	**%R**	**IC 95%**	**n**	**%R**	**IC 95%**
Amoxicilline	5236	43,2%	[41,9% - 44,6%]	211	59,7%	[53,1% - 66,3%]
Amoxicilline + acide clavulanique (cystite)	5235	21,0%	[19,9% - 22,1%]	222	32,0%	[25,8% - 38,1%]
Mecillinam	5172	6,2%	[5,6% - 6,9%]	222	11,3%	[7,1% - 15,4%]
Cefixime	5162	5,2%	[4,6% - 5,8%]	221	21,7%	[16,3% - 27,2%]
Céphalosporines de 3e génération[3]	5236	**5,7%**	[5,1% - 6,3%]	236	**21,2%**	[16% - 26,4%]
Ertapénème	5235	0,153%	[0,047% - 0,259%]	222	0,0%	[0% - 0%]
Acide nalidixique	87	70,1%	[60,5% - 79,7%]	5		
Fluoroquinolones[4]	5236	**8,6%**	[7,9% - 9,4%]	236	**14,0%**	[9,6% - 18,4%]
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole	5235	21,6%	[20,5% - 22,7%]	236	25,0%	[19,5% - 30,5%]
Fosfomycine	5172	1,5%	[1,2% - 1,9%]	221	3,2%	[0,9% - 5,5%]
Nitrofurantoïne	5162	0,4%	[0,3% - 0,6%]	236	4,7%	[2% - 7,4%]
Nombre de souches productrices de BLSE (n , %)	**240**	**4,6%**	**[4% - 5,2%]**	**44**	**18,6%**	**[13,7% - 23,6%]**
Nombre de souches productrices de carbapénémase (n , %)	**8**	**0,153%**	**[0,047% - 0,259%]**	**0**	**-**	**-**

[1] Données issues de la mission PRIMO

[2] Données issues de la mission SPARES

[3] Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftazidime

[4] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

Objectifs de la stratégie nationale 2022-2027

C3G-R : < 3% en ville / < 8% en Ehpad

FQ-R : < 10% en ville / < 18% en Ehpad

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Résistance aux antibiotiques (%) des souches urinaires de *E. coli*, selon le type d'hébergement et le sexe du patient. Mission PRIMO, Région Corse, Résultats 2025.

Souches urinaires de *E. coli* Année 2025	Patients vivant à domicile				Patients vivant en Ehpad			
	Femme n = 4 181		Homme n = 1 055		Femme n = 178		Homme n = 33	
Antibiotiques testés	**n**	**%R**	**n**	**%R**	**n**	**%R**	**n**	**%R**
Amoxicilline	4181	41,9%	1055	48,6%	178	58,4%	33	66,7%*
Amoxicilline + acide clavulanique (cystite)	4180	20,3%	1055	23,8%	178	30,3%	33	48,5%*
Mecillinam	4138	6,3%	1034	6,0%	178	10,1%	33	21,2%*
Cefixime	4132	4,8%	1030	6,7%	177	21,5%	33	18,2%*
Céphalosporines de 3e génération[1]	4181	5,1%	1055	8,2%	178	24,2%	33	12,1%*
Ertapénème	4180	0,144%	1055	0,190%	178	0,0%	33	0,0%*
Fluoroquinolones[2]	4181	7,9%	1055	11,4%	178	15,7%	33	12,1%*
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole	4180	21,2%	1055	23,1%	178	24,2%	33	42,4%*
Fosfomycine	4140	1,5%	1032	1,6%	177	3,4%	33	3,0%*
Nitrofurantoïne	4131	0,5%	1031	0,4%	178	6,2%	33	0,0%*
Nombre de souches productrices de BLSE (n , %)	**170 (4,1%)**		**70 (6,6%)**		**39 (21,9%)**		**3 (9,1%)***	
Nombre de souches productrices de carbapénémase (n , %)	**6 (0,144%)**		**2 (0,190%)**		**0**		**0***	

[1] Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftazidime

[2] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

* Nombre de souches < 50

La mission SPARES ne collectant pas l'information du sexe, seules les données PRIMO sont présentées dans ce tableau.

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Résistance aux antibiotiques (%) des souches de *E. coli* isolées dans les urines chez les patients vivant à domicile en fonction de l'âge. Mission PRIMO, Région Corse, Résultats 2025.


Souches urinaires de *E. coli* Année 2025	Patients vivant à domicile					
	Patients âgés de 0 à 4 ans n = 78		Patients âgés de 5 à 64 ans n = 2 350		Patients âgés de 65 ans ou plus n = 2 808	
Antibiotiques testés	**n**	**%R**	**n**	**%R**	**n**	**%R**
Amoxicilline	78	41,0%	2350	42,0%	2808	44,4%
Amoxicilline + acide clavulanique (cystite)	78	21,8%	2350	20,2%	2807	21,7%
Mecillinam	78	10,3%	2329	6,0%	2765	6,4%
Cefixime	78	3,8%	2324	4,7%	2760	5,6%
Céphalosporines de 3e génération[1]	78	3,8%	2350	4,9%	2808	6,4%
Ertapénème	78	0,0%	2350	0,085%	2807	0,214%
Fluoroquinolones[2]	78	7,7%	2350	6,8%	2808	10,2%
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole	78	23,1%	2349	21,1%	2808	21,9%
Fosfomycine	78	2,6%	2329	1,4%	2765	1,6%
Nitrofurantoïne	78	0,0%	2324	0,3%	2760	0,6%
Nombre de souches productrices de BLSE (n , %)	**3 (3,8%)**		**92 (3,9%)**		**145 (5,2%)**	
Nombre de souches productrices de carbapénémase (n , %)	**0**		**2 (0,085%)**		**6 (0,214%)**	

[1] Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftazidime

[2] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Evolution du pourcentage de souches de *Escherichia coli* productrices de BLSE dans les prélèvements urinaires selon le type d'hébergement. Mission PRIMO, Région Corse, Résultats 2025.



*Pour l'année 2023, seules les données PRIMO ont été incluses pour les résultats en Ehpad

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

3. *Klebsiella pneumoniae* : Résistance aux antibiotiques

Pourcentage de souches de *Klebsiella pneumoniae* productrices de BLSE dans les prélèvements urinaires selon le type d'hébergement. Mission PRIMO, Région Corse, Résultats 2025.


	Patients vivant à domicile[1]		Patients vivant en Ehpad[1,2]	
***K. pneumoniae* Urinaires**	**n**	**BLSE (n,%)**	**n**	**BLSE (n,%)**
Corse	**993**	**75 (7,6%)**	**55**	**16 (29,1%)**
Corse-du-Sud	145	5 (3,4%)	1	0*
Haute-Corse	848	70 (8,3%)	54	16 (29,6%)

[1] Données issues de la mission PRIMO


[2] Données issues de la mission SPARES

* Nombre de souches < 50

Cartographie % BLSE – Patients vivant à domicile



Cartographie % BLSE – Patients vivant en Ehpad



Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Résistance aux antibiotiques (%) des souches de *Klebsiella pneumoniae* isolées d'urines de patients vivant à domicile ou en Ehpad. Mission PRIMO, Région Corse, Résultats 2025.

Souches urinaires de *K. pneumoniae* Année 2025	Patients vivant à domicile[1] n = 993			Patients vivant en Ehpad[1,2] n = 55		
Antibiotiques testés	**n**	**%R**	**IC 95%**	**n**	**%R**	**IC 95%**
Amoxicilline	993	100,0%	[100% - 100%]	55	100,0%	[100% - 100%]
Amoxicilline + acide clavulanique (cystite)	993	21,1%	[18,6% - 23,7%]	55	38,2%	[25,3% - 51%]
Mecillinam	695	6,0%	[4,3% - 7,8%]	49	4,1%*	[0% - 9,6%]*
Céphalosporines de 3e génération[3]	993	8,7%	[6,9% - 10,4%]	55	29,1%	[17,1% - 41,1%]
Ertapénème	993	0,604%	[0,122% - 1,086%]	55	0,0%	[0% - 0%]
Acide nalidixique	26	73,1%*	[56% - 90,1%]*	2		
Fluoroquinolones[4]	992	7,4%	[5,7% - 9%]	55	32,7%	[20,3% - 45,1%]
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole	993	10,5%	[8,6% - 12,4%]	55	30,9%	[18,7% - 43,1%]
Fosfomycine	1			0		
Nitrofurantoïne	806	21,7%	[18,9% - 24,6%]	51	29,4%	[16,9% - 41,9%]
Nombre de souches productrices de BLSE (n , %)	**75**	**7,6%**	**[5,9% - 9,2%]**	**16**	**29,1%**	**[17,1% - 41,1%]**
Nombre de souches productrices de carbapénémase (n , %)	**5**	**0,50%**	**[0,063% - 0,944%]**	**0**	**-**	**-**

[1] Données issues de la mission PRIMO

[2] Données issues de la mission SPARES

[3] Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftazidime

[4] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

* Nombre de souches < 50

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Résistance aux antibiotiques (%) des souches urinaires de *K. pneumoniae*, selon le type d'hébergement et le sexe du patient. Mission PRIMO, Région Corse, Résultats 2025.

Souches urinaires de *K. pneumoniae* Année 2025	Patients vivant à domicile				Patients vivant en Ehpad			
	Femme n = 765		Homme n = 228		Femme n = 37		Homme n = 15	
Antibiotiques testés	**n**	**%R**	**n**	**%R**	**n**	**%R**	**n**	**%R**
Amoxicilline	765	100,0%	228	100,0%	37	100,0%*	15	100,0%*
Amoxicilline + acide clavulanique (cystite)	765	18,8%	228	28,9%	37	35,1%*	15	53,3%*
Mecillinam	532	4,9%	163	9,8%	34	2,9%*	15	6,7%*
Céphalosporines de 3e génération[1]	765	6,9%	228	14,5%	37	29,7%*	15	26,7%*
Ertapénème	765	0,131%	228	2,193%	37	0,0%*	15	0,0%*
Fluoroquinolones[2]	764	5,9%	228	12,3%	37	35,1%*	15	33,3%*
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole	765	9,0%	228	15,4%	37	29,7%*	15	33,3%*
Fosfomycine	1		0		0		0	
Nitrofurantoïne	625	20,8%	181	24,9%	35	25,7%*	14	35,7%*
Nombre de souches productrices de BLSE (n , %)	**47 (6,1%)**		**28 (12,3%)**		**11 (29,7%)***		**4 (26,7%)***	
Nombre de souches productrices de carbapénémase (n , %)	**0**		**5 (2,19%)**		**0***		**0***	

[1] Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftazidime

[2] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

* Nombre de souches < 50

La mission SPARES ne collectant pas l'information du sexe, seules les données PRIMO sont présentées dans ce tableau.

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Résistance aux antibiotiques (%) des souches de *K. pneumoniae* isolées dans les urines chez les patients vivant à domicile en fonction de l'âge. Mission PRIMO, Région Corse, Résultats 2025.

Souches urinaires de *K. pneumoniae* Année 2025	Patients vivant à domicile					
	Patients âgés de 0 à 4 ans n = 8		Patients âgés de 5 à 64 ans n = 379		Patients âgés de 65 ans ou plus n = 606	
Antibiotiques testés	**n**	**%R**	**n**	**%R**	**n**	**%R**
Amoxicilline	8		379	100,0%	606	100,0%
Amoxicilline + acide clavulanique (cystite)	8		379	19,3%	606	22,4%
Mecillinam	5		276	3,6%	414	7,7%
Céphalosporines de 3e génération[1]	8		379	5,5%	606	10,6%
Ertapénème	8		379	0,0%	606	0,990%
Fluoroquinolones[2]	8		378	4,2%	606	9,1%
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole	8		379	6,9%	606	12,5%
Fosfomycine	0		0		1	
Nitrofurantoïne	6		311	22,5%	489	21,1%
Nombre de souches productrices de BLSE (n , %)	**1***		**20 (5,3%)**		**54 (8,9%)**	
Nombre de souches productrices de carbapénémase (n , %)	**0***		**0**		**5 (0,83%)**	


[1] Cefotaxime, Ceftriaxone, Ceftazidime

[2] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

* Nombre de souches < 50

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Evolution du pourcentage de souches de *Klebsiella pneumoniae* productrices de BLSE dans les prélèvements urinaires selon le type d'hébergement.
Mission PRIMO, Région Corse, Résultats 2025.



*Pour l'année 2023, seules les données PRIMO ont été incluses pour les résultats en Ehpad

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

4. *Staphylococcus aureus* : Résistances aux antibiotiques

Pourcentage de SARM isolées dans les prélèvements hors urinaires selon le type d'hébergement. Mission PRIMO, Région Corse, Résultats 2025.


	Patients vivant à domicile[1]		Patients vivant en Ehpad[1,2]	
Staphylococcus aureus Hors urinaires	n	SARM (n,%)	n	SARM (n,%)
Corse	**378**	**24 (6,3%)**	**5**	**1***
Corse-du-Sud	84	8 (9,5%)	0	0*
Haute-Corse	294	16 (5,4%)	5	1*

[1] Données issues de la mission PRIMO

[2] Données issues de la mission SPARES

* Nombre de souches < 50

Cartographie % SARM – Patients vivant à domicile



Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Résistance aux antibiotiques (%) des souches de *Staphylococcus aureus* isolées de prélèvements hors urinaires selon le type d'hébergement. Mission PRIMO, Région Corse, Résultats 2025.

Souches hors urinaires de *S. aureus* Année 2025	Patients vivant à domicile[1] n = 378			Patients vivant en Ehpad[1,2] n = 5		
Antibiotiques	**n**	**%R**	**IC 95%**	**n**	**%R**	**IC 95%**
Oxacilline[3]	378	6,3%	[3,9% - 8,8%]	5		
Fluoroquinolones[4]	378	4,0%	[2% - 5,9%]	5		
Gentamicine	378	1,3%	[0,2% - 2,5%]	5		
Erythromycine	378	37,6%	[32,7% - 42,4%]	5		
Clindamycine	155	2,6%	[0,1% - 5,1%]	0		
Pristinamycine	0			0		
Acide fusidique	156	16,0%	[10,3% - 21,8%]	0		
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole	378	1,9%	[0,5% - 3,2%]	5		
Rifampicine	377	1,3%	[0,2% - 2,5%]	5		

[1] Données issues de la mission PRIMO

[2] Données issues de la mission SPARES

[3] Résistance à l'oxacilline = SARM

[4] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Résistance aux antibiotiques (%) des souches de *S. aureus* isolées de prélèvements hors urinaires chez les patients vivant à domicile en fonction de l'âge. Mission PRIMO, Région Corse, Résultats 2025.


Souches hors urinaires de *S. aureus* Année 2025	Patients vivant à domicile					
	Patients âgés de 0 à 4 ans n = 10		Patients âgés de 5 à 64 ans n = 269		Patients âgés de 65 ans ou plus n = 99	
Antibiotiques	**n**	**%R**	**n**	**%R**	**n**	**%R**
Oxacilline	10	0,0%*	269	6,3%	99	7,1%
Fluoroquinolones[1]	10	0,0%*	269	3,3%	99	6,1%
Erythromycine	10	10,0%*	269	36,4%	99	43,4%
Clindamycine	3		107	2,8%	45	2,2%*
Pristinamycine	0		0		0	
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole	10	0,0%*	269	1,9%	99	2,0%

[1] Ofloxacine, Lévofloxacine, Ciprofloxacine

* Nombre de souches < 50

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr

Evolution (%) des souches de *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline isolées de prélèvements hors urinaires selon le type d'hébergement.
Mission PRIMO, Région Corse, Résultats 2025.



*Pour l'année 2023, seules les données PRIMO ont été incluses pour les résultats en Ehpad

Données sous embargo – A usage interne professionnel - Plus d'informations sur antibioresistance.fr