Réseau piloté par Santé publique France

RÉPIA PRIMO

SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN VILLE ET EN EHPAD
ANNÉE 2025



RÉGION CORSE


LES DONNÉES SONT ISSUES DE

16 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE SUR 25


Laboratoire participant à PRIMO
Laboratoire ne participant pas à PRIMO

ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

- 6 810 ANTIBIOGRAMMES D'ENTÉROBACTÉRIES
- 6 723 ANTIBIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES
- LES RÉSULTATS PAR SEXE CONCERNENT LES 18 ANS ET PLUS



Répartition des antibiogrammes urinaires selon les espèces d'entérobactéries
(n = 6 723)




Répartition des antibiogrammes d'entérobactéries selon le prélèvement
(n = 6 810)

** Klebsiella oxytoca, Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae complex*


Réseau piloté par Santé publique France
RÉPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES *Escherichia coli* (urines)

CHEZ LA FEMME



CHEZ L'HOMME



LES MESSAGES DE BON USAGE

- **Fosfomycine, pivmécillinam et nitrofurantoïne** Faible taux de résistance autorisant leur utilisation en 1e intention dans les **cystites féminines et masculines** (mauvaise diffusion rénale).
- **Amoxicilline :** non utilisable en probabiliste en raison de résistances fréquentes, mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe (notamment en cas de **cystite féminine ou masculine ou de pyélonéphrite**).

- C3G (Céphalosporines 3e génération) : utilisation réservée à une **utilisation probabiliste dans les pyélonéphrites et prostatites** du fait de leur large spectre.
- FQ (Fluoroquinolones) : **éviter les FQ en traitement probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois.** Utilisation possible dans les prostatites, 4e option antibiotique par ordre de préférence dans les pyélonéphrites documentées.

Réseau piloté par Santé publique France
RéPIA PRIMO

RÉSISTANCES OBSERVÉES

Escherichia coli (urines)


À DOMICILE

C3G
Céphalosporines 3ème génération
(Céfotaxime ou ceftriaxone ou ceftazidime)

5,1%

RÉGION 5,7%

Cible 2027 <3%



Pas de données suffisantes
[0%-2,5%]
]2,5%-5%]
]5%-10%]
]10%-20%]
]20%+


Départements	Effectifs Ville
Corse-du-Sud	723
Haute-Corse	4513

FQ
Fluoroquinolones

9,0%

RÉGION 8,6%

Cible 2027 <10%




Pas de données suffisantes
[0%-10%]
]10%-15%]
]15%-20%]
]20%-30%]
]30%+

EN EHPAD

10,0%

RÉGION 21,2%

Cible 2027 <8%




Pas de données suffisantes
[0%-2,5%]
]2,5%-5%]
]5%-10%]
]10%-20%]
]20%+

11,6%

RÉGION 14,0%

Cible 2027 <18%



Pas de données suffisantes
[0%-10%]
]10%-15%]
]15%-20%]
]20%-30%]
]30%+

Départements	Effectifs Ehpad
Corse-du-Sud	15
Haute-Corse	221

*Nombre de souches < 50

Réseau piloté par RéPIA PRIMO Santé publique France

LIENS UTILES

Lien vers le site RéPIA - PRIMO

Surveillance de la résistance aux antibiotiques

Prévention de la résistance aux antibiotiques

Prévention des infections associées aux soins

Lien vers le site CRAtb Corse

Structure publique régionale d'expertise et d'appui aux professionnels de santé pour un meilleur usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance



Réseau piloté par Santé publique France