
Réseau piloté par Santé publique France

RÉPIA PRIMO

SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN VILLE ET EN EHPAD
ANNÉE 2025



RÉGION GRAND-EST


LES DONNÉES SONT ISSUES DE

259 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE SUR 406

Laboratoire participant à PRIMO
Laboratoire ne participant pas à PRIMO

ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

- 98 746 ANTIBIOGRAMMES D'ENTÉROBACTÉRIES
- 97 718 ANTIBIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES
- LES RÉSULTATS PAR SEXE CONCERNENT LES 18 ANS ET PLUS




Répartition des antibiogrammes urinaires selon les espèces d'entérobactéries
(n = 97 718)

** Klebsiella oxytoca, Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae complex*


RÉPIA PRIMO Réseau piloté par Santé publique France

RÉSISTANCES OBSERVÉES *Escherichia coli* (urines)

CHEZ LA FEMME



CHEZ L'HOMME



LES MESSAGES DE BON USAGE

- **Fosfomycine, pivmécillinam et nitrofurantoïne** Faible taux de résistance autorisant leur utilisation en 1e intention dans les **cystites féminines et masculines** (mauvaise diffusion rénale).
- **Amoxicilline :** non utilisable en probabiliste en raison de résistances fréquentes, mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe (notamment en cas de **cystite féminine ou masculine ou de pyélonéphrite**).

- C3G (Céphalosporines 3e génération) : utilisation réservée à une **utilisation probabiliste dans les pyélonéphrites et prostatites** du fait de leur large spectre.
- FQ (Fluoroquinolones) : **éviter les FQ en traitement probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois.** Utilisation possible dans les prostatites, 4e option antibiotique par ordre de préférence dans les pyélonéphrites documentées.

Réseau piloté par RéPIA PRIMO Santé publique France

RÉSISTANCES OBSERVÉES — *Escherichia coli* (urines)

C3G
Céphalosporines 3ème génération
(Céfotaxime ou ceftriaxone ou ceftazidime)


Départements	Effectifs Ville
Ardennes	6184
Aube	5452
Bas-Rhin	8134
Haute-Marne	1013
Haut-Rhin	7473
Marne	2199
Meurthe-et-Moselle	16578
Meuse	3901
Moselle	18584
Vosges	6366

FQ
Fluoroquinolones

À DOMICILE


5,1%

RÉGION 4,9%



9,0%


RÉGION 8,7%



EN EHPAD


10,0%

RÉGION 9,5%



11,6%

RÉGION 11,1%



Départements	Effectifs Ehpad
Ardennes	263
Aube	467
Bas-Rhin	713
Haute-Marne	66
Haut-Rhin	541
Marne	42
Meurthe-et-Moselle	758
Meuse	94
Moselle	756
Vosges	868

*Nombre de souches < 50

Réseau piloté par RéPIA PRIMO Santé publique France

LIENS UTILES

RéPIA PRIMO

Lien vers le site RéPIA - PRIMO

Surveillance de la résistance aux antibiotiques

Prévention de la résistance aux antibiotiques

Prévention des infections associées aux soins

ANTIBIOEST
CENTRE RÉGIONAL EN ANTIBIOTHÉRAPIE DU GRAND EST

Lien vers le site CRAtb Grand Est

Structure publique régionale d'expertise et d'appui aux professionnels de santé pour un meilleur usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance

