

FICHE PRATIQUE – COVID-19 VACCINE MODERNA

(Vaccin à ARNm, à nucléoside modifié, codant pour la protéine S)

Présentation

Dispersion injectable sous forme de flacons multidoses de 5 mL (10 doses)

Dispersion de couleur blanche à blanc cassé



Boîte de 10 flacons

Conservation

- Congélateur entre -25 et -15°C (à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine)
- Peut être conservé 7 mois



Flacon non ouvert



- Réfrigérateur entre 2-8°C (à l'abri de la lumière)
- Jusqu'à 30 jours (ou 12 heures maximum à température ambiante < 25°C)
- Ne doit pas être recongelé

Étiquette du flacon :

Date et heure de décongélation et de péremption (30 jours)



Après ouverture du flacon

2°C - 25°C 6 heures maximum



Étiquette du flacon :

Date et heure de dilution et de péremption (6 heures)

Ces durées de conservation doivent être impérativement respectées.

Préparation

Le flacon doit être décongelé au réfrigérateur (2 – 8°C) pendant 2h30 ou à température ambiante (15 - 25°C) pendant 1 heure.

Laisser le flacon atteindre la température ambiante (< 25°C).

Tourner délicatement le flacon, après décongélation et avant chaque prélèvement. Ne pas secouer. Aucune dilution à effectuer.

Utiliser une technique d'asepsie rigoureuse.

Prélever 0,5 mL de vaccin du flacon multidose à l'aide d'une seringue de 1 mL avec une aiguille appropriée.

Ne pas regrouper le produit résiduel provenant de différents flacons.

En cas de préparation à l'avance

Étiquette de la seringue :

Nom du vaccin, n° lot, date et heure limite d'utilisation

Dans « vaccin COVID » et dossier patient :

Nom du vaccin, n° lot, date et heure de l'administration

Administration

Après avoir réalisé une asepsie de la peau au point d'injection, administrer une dose (0,5 mL) par voie intramusculaire (IM), de préférence dans le muscle deltoïde de la partie supérieure du bras.



Anaphylaxie : Surveillance étroite du patient pendant au moins 15 minutes

→ Disposer d'un kit d'anaphylaxie



Pensez à déclarer tout effet indésirable à votre CRPV

Élimination du matériel

Éliminer la seringue et l'aiguille dans un container DASRI adapté aux objets piquants, coupants, tranchants.

Tout vaccin non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément aux exigences locales.

Schéma AMM : 2 doses (4 semaines d'intervalle)



La HAS recommande de privilégier un intervalle de 6 semaines entre les deux doses