


FICHE PRATIQUE – COVID-19 VACCINE JANSSEN®

(Vaccin à vecteur viral recombinant non répliquatif, codant pour la glycoprotéine S du SARS-CoV-2)



Boîte de 10 flacons

Présentation

Suspension injectable prête à l'emploi sous forme de flacons multidoses de 2,5 mL (5 doses)
Suspension incolore à légèrement jaune, limpide à très opalescente

Conservation

Flacon non ouvert



Congélateur entre -25°C et -15°C (à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine)

- Peut être conservé **2 ans**
- Peut être transporté

Réfrigérateur entre 2°C-8°C (à l'abri de la lumière)

- Peut être conservé et transporté pendant une seule période allant jusqu'à **3 mois**
- **Ne doit pas être recongelé**

Étiquette du flacon :

Date et heure de décongélation et péremption (3 mois)

En cas d'excursion de température (flacon non ouvert) :
Stabilité = **12 heures** entre 9°C et 25°C

Après ouverture du flacon



OU

Réfrigérateur entre 2°C-8°C :
6 heures maximum



Température ambiante (≤ 25°C) :
3 heures maximum

Étiquette du flacon :

Date et heure d'ouverture et péremption

Ces durées de conservation doivent être impérativement respectées.

Préparation

Décongélation

Si le flacon est conservé entre -25°C et -15°C, il doit être décongelé avant administration.

Décongélation au réfrigérateur (2°C - 8°C)



Pendant **2 heures**

OU



Pendant **13 heures**

OU

Décongélation à température ambiante (≤ 25°C)



Pendant **1 heure**

OU



Pendant **4 heures**

Prélèvement de la dose

Inspecter le flacon visuellement. Agiter le flacon en le tournant doucement en position verticale pendant **10 secondes**. Aucune dilution à effectuer. **Ne pas secouer**. Utiliser une technique d'asepsie rigoureuse. **Prélever 0,5 mL de solution** du flacon multidose à l'aide d'une seringue avec une aiguille appropriée. Un maximum de 5 doses peut être prélevé du flacon multidose. **Ne pas regrouper le produit résiduel** provenant de différents flacons.

Administration

Après avoir réalisé une asepsie de la peau au point d'injection, administrer une dose (0,5 mL) par **voie intramusculaire (IM)**, de préférence dans le muscle deltoïde de la partie supérieure du bras.

Anaphylaxie : Surveillance étroite du patient pendant au moins 15 minutes
→ Disposer d'un **kit d'anaphylaxie**

Dans « vaccin COVID » et **dossier patient** :
Nom du vaccin, n° lot, date et heure de l'administration

Élimination du matériel

Éliminer la seringue et l'aiguille dans un container DASRI adapté aux objets piquants, coupants, tranchants. Tout vaccin non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur (contient des OGM). En cas d'éclaboussures, désinfecter à l'aide d'agents virucides actifs contre l'adénovirus.

Schéma AMM : **1 dose unique**



Pensez à déclarer tout effet indésirable à votre **CRPV**