

Equipements de Protection Individuelle recommandés pour la prise en charge de patient suspect/confirmé COVID-19

Secteurs d'exercice	Consultation ou soins	Tablier plastique jetable	Surblouse à usage unique	Masque chirurgical	Masque FFP2	Lunettes/visière de protection	Gants à usage unique	Exemples
Centres de santé, cabinets, domicile des patients...	Sans contact avec le patient <i>Précautions standard et gouttelettes</i>	✗	✗	✓	✗	✓	✗	Consultation sans examen (ex: éducation thérapeutique...)
	Avec contact mais SANS risque d'exposition aux liquides biologiques <i>Précautions standard, contact et gouttelettes</i>	✓	✗	✓	✗	✓	✗	Au cabinet (ex : prise des constantes, ...) Au domicile (ex : lever, mise au fauteuil, aide à la marche, conduite aux toilettes, prévention d'escarre, massage...)
	Avec contact ET risque d'exposition aux liquides biologiques (sang, urines, selles) <i>Précautions standard, contact et gouttelettes</i>	✓	✗*	✓	✗	✓	✓	Au cabinet ou au domicile (ex : toilette, change, prise de sang, pansements de plaie et dispositifs invasifs...)
	Procédures à risque d'aérosolisation <i>Précautions standard, contact + aérosolisation</i>	✓	✗*	✗	✓	✓	✓	Ex : prélèvement nasopharyngé, kinésithérapie respiratoire générant des aérosols, soins de trachéotomie, oxygénothérapie à haut débit (> 6 L/min)

* Une surblouse à manches longues jetable sera portée dans le cadre d'une exposition massive aux liquides biologiques (ex: diarrhée, vomissements, hémoptysie...)

L'utilisation des équipements de protection individuelle doit être impérativement associée à une tenue de travail changée et entretenue quotidiennement et une **observance stricte de l'hygiène des mains**

